

KLEMENS KĘPCZYŃSKI

Rośliny rzadziej spotykane na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Część III — Seltener Pflanzen des Diluvialplateaus von Dobrzyń. Teil III

Wpłynęło 10. X. 1963

Trzeci z kolei wykaz obejmuje zaobserwowane przeze mnie w roku 1962 stanowiska rzadszych roślin głównie w środkowej i północnej części Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Nomenklaturę i układ gatunków (z wyjątkiem mszaków) opieram na „Roślinach polskich” W. Szafera, S. Kulczyńskiego i B. Pawłowskiego (1953).

Ricciaceae

Ricciocarpus natans (L.) Corda. — Rzadko, w zarastających dołach, Dobrzejewice pow. Toruń, oraz w zarastającym jeziorze — Mecowizna pow. Lipno.

Thuidiaceae

Thuidium lanatum (Stroem) Moenk. — Rzadko, na torfowiskach niskich w miejscach zakrzewionych. Ruda, Żałe, Rojewo, Wierzchowiska pow. Rypin.

Amblystegiaceae

Scorpidium scorpioides (L.) Lmpr. — Rzadko, w miejscach podmokłych, okresowo zalewanych na torfowiskach niskich. Gorzeszyn pow. Lipno.

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum L. — Dość rzadko, na średniowilgotnych łąkach, zwykle w zbiorowiskach z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*. Kwirynowo, Rumunki Maliszewo pow. Lipno, Skudzawy pow. Rypin, Zambrzyca pow. Sierpc.

Polypodiaceae

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — Dość rzadko, w lasach na zboczach w miejscach cienistych. Głodowo, Nagórzynek, Sकेpe, Suradowo, Wyrzuty, Żuchowo pow. Lipno.

Phegopteris dryopteris (L.) Fée. — Dość rzadko, głównie w lasach sosnowych, w miejscach zacienionych. Rumunki Wólczkańskie, Sकेpe pow. Lipno oraz w pobliżu miejscowości Lidzbark (welski), Nowy Dwór pow. Działdowo.

Dryopteris cristata (L.) A. Gray — Rzadko, na torfowiskach porośniętych krzewami oraz wśród olszyn. Dębiny, Mecowizna pow. Lipno, Ruda, Żałe pow. Rypin.

D. austriaca (Jacq.) Woynar — Dość rzadko, w olszynach w miejscach średnio-wilgotnych. Bednarka, Czarne, Dzierżączka, Kamienica, Korytkowo, Koziółek, Krzyżówki, Modrzewie pow. Lipno oraz w pobliżu miejscowości Brudzeń pow. Płock.

Equisetaceae

Equisetum maximum L. — Bardzo rzadko, obok źródlisk i cieków na zboczach doliny Wisły. Bachorzewo pow. Lipno.

E. pratense Ehrh. — Dość rzadko, w lasach, głównie liściastych. Dyblin, Łochocin, Nasięgniewo, Pokrzywnik pow. Lipno.

E. hiemale L. — Dość rzadko, na zboczach w wilgotnych lasach. Łąkie pow. Lipno obok jeziora w lesie sosnowym, Maliszewo pow. Lipno na zboczach doliny Mieni, Karnkowo pow. Lipno na zboczu obok strumyka płynącego przez wieś.

E. ramosissimum Desf. — Rzadko, na aluwialnych nadbrzeżnych. Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo pow. Lipno.

Lycopodiaceae

Lycopodium annotinum L. — Dość rzadko, w lasach sosnowych. Chrapoń pow. Żuromin, Jamielnik pow. Działdowo, Koźle Błotko pow. Brodnica, Kamienica pow. Lipno.

L. clavatum L. — Dość często, w lasach sosnowych; zwykle z domieszką świerka i brzozy. Gorzeszyn, Ignackowo, Rumunki Jasińskie pow. Lipno, Jamielnik pow. Działdowo, Koźle Błotko pow. Brodnica, Lipniki, Września pow. Sierpc, Okalewo pow. Rypin.

Betulaceae

Alnus incana (L.) Mch. — Dość rzadko, w miejscach podmokłych. Dyblin pow. Lipno obok strumyka, Klonowo pow. Golub-Dobrzyń obok jeziora, Okonin pow. Rypin przy strumyku.

Salicaceae

Salix livida Whlb. — Bardzo rzadko, na torfowiskach w miejscach średnio-wilgotnych. Ostrowite, Duża Wólka pow. Lipno, Lisiny pow. Rypin.

S. nigricans Sm. — Rzadko, na torfowiskach, głównie w zbiorowisku *Salico-Franguletum*. Blinno, Blizno pow. Sierpc, Czermno (obok toru kolejowego), Grądy Nowe, Szczekarzewo pow. Lipno.

Santalaceae

Thesium ebracteatum L. — Rzadko, na skraju lasu sosnowego w pobliżu miejscowości Lubowidz pow. Działdowo.

T. linophyllum L. — Dość rzadko, na brzegach suchych lasów sosnowych. Brzeźno, Korytkowo, Kwirynowo pow. Lipno.

Caryophyllaceae

Tunica prolifera (L.) Scop. — Rzadko, na suchych zboczach doliny Wisły. Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Glewo pow. Lipno.

Dianthus deltoides L. — Rzadko, na suchej łące przy lesie sosnowym. Dębiny pow. Lipno.

D. arenarius L. — Dość rzadko, na suchych, piaszczystych wzgórzach oraz w widnych lasach sosnowych. Drozdowiec, Jankowo, Korytkowo, Kwirynowo, Świerczyny pow. Lipno, Żeleźniki pow. Toruń.

Gypsophila fastigiata L. — Rzadko, w miejscach suchych, piaszczystych. Świerczyny, Wierzbinki, Witoważ pow. Lipno, Żeleźniki pow. Toruń.

Melandrium rubrum (Weig.) Garcke — Dość rzadko, głównie wśród olszyn. Nowe Rybitwy pow. Lipno, Brudnice pow. Żuromin.

Silene otites (L.) Wib. — Dość rzadko, na suchych piaszczystych wzgórzach i zboczach. Świerczyny, Wierzbinki, Witoważ pow. Lipno, Żeleźniki pow. Toruń.

Euphorbiaceae

Euphorbia dulcis L. — Dość rzadko, w cienistych lasach liściastych. Szpiegowo pow. Lipno w lesie jesionowo-wiązowym, Trąbin pow. Rypin w lesie bukowym z domieszką graba, Paliwodziczna pow. Golub-Dobrzyń w lesie dębowo-grabowym.

Callitrichaceae

Callitriche autumnalis L. — Rzadko, głównie w rowach z wolno płynącą wodą. Chalin, Sarnowo, Żuchowo pow. Lipno.

C. hamulata Kütz. — Bardzo rzadko, w rowie obok miejscowości Babie Ławy w powiecie lipnowskim.

Ranunculaceae

Trollius europaeus L. — Rzadko, wśród olszyn w pobliżu miejscowości Brudzeń pow. Płock.

Isopyrum thalictroides L. — Rzadko, w lasach liściastych w miejscach cienistych. Nasięgniewo, Szpiegowo pow. Lipno.

Actaea spicata L. — Dość rzadko, w lasach liściastych. Brudnice pow. Żuromin, Nasięgniewo pow. Lipno.

Cimicifuga europaea Spicz. — Bardzo rzadko, na brzegach linii oddziałowych. Piaseczno pow. Działdowo.

Aquilegia vulgaris L. — Dość rzadko, w widnych lasach sosnowych, na polanach oraz przy liniach oddziałowych. Lidzbark (welski) pow. Działdowo, Nowy Świat pow. Brodnica.

Aconitum variegatum L. — Bardzo rzadko, na dnie parowu w miejscu kamienistym. Suradowo pow. Lipno.

Pulsatilla patens (L.) Mill. — Rzadko, w lasach sosnowych. Huta Skępska, Nieszawka, Korytkowo, Rumunki Jasieńskie, Szczekarzewo, Wyrzuty pow. Lipno, Nowy Dwór pow. Działdowo, Nowy Świat pow. Brodnica.

P. pratensis (L.) Mill. — Nieco częściej niż poprzedni gatunek, w widnych lasach sosnowych oraz na wzgórzach. Gnojno, Kwirynowo, Łąkie, Piaski, Truminy, Witoważ, Wylewy pow. Lipno, Żelazniki pow. Toruń.

Ranunculus Steveni Andrż. — Rzadko, na zboczu rynny suradowskiej w pobliżu miejscowości Pokrzywnik pow. Lipno.

Nymphaeaceae

Nymphaea candida Presl. — Dość rzadko na obszarze powiatu lipnowskiego — Rumunki Likiec w bagnach śródlęsnych, Trzebiegoszcz w Jeziorze Świętym, Rumunki Czarne w małych jeziorach śródlęsnych, poza tym w jeziorze Urszulewo obok miejscowości Karlewo pow. Sierpc.

Nuphar pumilum (Timm.) DC. — Bardzo rzadko, w jeziorze Łąkie i Sobieraj pow. Lipno.

Papaveraceae

Papaver dubium L. — Rzadko, na nasypie kolejowym w pobliżu miejscowości Rumunki Podgłodowo pow. Lipno.

P. strigosum (Boenn.) Schur. — Rzadko, na polach obok miejscowości Dębiany pow. Rybin.

Corydalis cava (L.) Schw. et K. — Rzadko, w lasach liściastych i zaroślach. Maliszewo, Wąkole, Zieleniewszczyzna pow. Lipno.

Cruciferae

Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br. — Rzadko, w miejscach piaszczystych. Czermno, Konotopie pow. Lipno.

Droseraceae

Drosera rotundifolia L. — Na torfowiskach niskich i przejściowych. Barany, Ignackowo, Krzyżówki, Łochocin, Podole, Popielarka, Rumunki Czarne, Rumunki Komorowo pow. Lipno, Jamielnik pow. Działdowo, Szczutowo pow. Sierpc.

Violaceae

Viola collina Bess. — Rzadko, na suchych zboczach. Mszczonne, Wąkole pow. Lipno.

Guttiferae

Hypericum montanum L. — Dość rzadko, w widnych lasach liściastych i sosnowych. Nasięgniewo, Żuchowo pow. Lipno, Szafarnia pow. Golub-Dobrzyń, Lubowidz, Nowy Dwór, Piaseczno pow. Działdowo.

Crassulaceae

Sedum sexangulare L. — Dość rzadko, na zboczach i wzgórzach w miejscach suchych piaszczystych. Dębiny, Mień, Moszczonne, Nieszawka, Nowe Rybitwy, Nowogródek pow. Lipno, Białkowo pow. Golub-Dobrzyń, Uniejowo pow. Płock.

S. reflexum L. Rzadko, na piaszczystym zboczu doliny Mieni w pobliżu miejscowości Rumunki Podgłódowo pow. Lipno.

Saxifragaceae

Saxifraga granulata L. — Rzadko, Nagórzynek pow. Lipno na brzegu lasu sosnowego, Maliszewo pow. Lipno na łące obok drogi.

Rosaceae

Rosa pomifera Herrm. — Na skraju lasu sosnowego obok miejscowości Nagórzynek.

Potentilla norvegica L. — Rzadko, na wilgotnej łące obok miejscowości Ławiczek pow. Lipno.

P. verna L. — Rzadko, w suchym, widnym lesie sosnowym w pobliżu miejscowości Żuchowo pow. Lipno.

Alchemilla glaucescens Wallr. — Bardzo rzadko, zaobserwowano parę okazów na suchej łące obok miejscowości Trzebiegoszcz pow. Lipno. Jest to drugie znane dotychczas stanowisko na obszarze nizin północnej Polski.

Aphanes arvensis L. — Niezbyt często, na polach. Jasień, Czarne, Ostrowite pow. Lipno, Dębiny, Czumsk pow. Rypin.

Agrimonia odorata Mill. — Rzadko, wśród zarośli, w miejscach średniowilgotnych. Blizno pow. Sierpc.

Papilionaceae

Cytisus ratisbonensis Schaeff. — Dość często, w widnych, suchych lasach sosnowych. Głódowo, Pokrzywnik, Rumunki Czarne, Rumunki Jasieńskie pow. Lipno, Nowy Świat pow. Brodnica, Bryńsk Szlachecki pow. Działdowo, Syberia pow. Żuromin, Karlewo pow. Sierpc.

Trifolium fragiferum L. — Na średniowilgotnych łąkach. Chrapoń, Jonne, Lipniki pow. Żuromin, Czumsk Duży, Kobrzyniec Nowy, Lisiny, Ostrowite, Rogowo, Rumunki Rogówko pow. Rypin, Bógzapłać, Rumunki Sarnowo, Rumunki Łąkie pow. Lipno.

Astragalus arenarius L. — W widnych, suchych lasach sosnowych i na piaszczystych wzgórzach. Rumunki Czarne, Rumunki Jasieńskie, Rumunki Likiec, Sarnowo, Suradowo, Wąkole, Witoważ, Wylewy, Złotopole pow. Lipno, Żelaźniki pow. Toruń, Szczutowo pow. Sierpc, Urszulewo pow. Rypin, Jonne pow. Żuromin.

Onobrychis arenaria (Kit) Ser. — Rzadko, na nasypie kolejowym obok miejscowości Karnkowo pow. Lipno.

Vicia cassubica L. — Widne, suche lasy sosnowe. Podole, Rumunki Czarne, Rumunki Jasieńskie, Wyrzuty pow. Lipno, Szafarnia pow. Golub-Dobrzyń, Kozie Błotko pow. Brodnica.

V. lathyroides L. — Bardzo rzadko, w suchych, widnych lasach sosnowych. Nagórzynek, Wyrzuty, Żuchowo pow. Lipno.

Thymelaeaceae

Daphne mezereum L. — Rzadko, w cienistych lasach liściastych. Nowy Świat pow. Brodnica, Piaseczno pow. Działdowo.

Lythraceae

Peplis portula L. — Dość rzadko, na łąkach i polach. Duża Wólka pow. Lipno, Modrzewie pow. Sierpc, Skudzawy pow. Rypin.

Oenotheraceae

Epilobium montanum L. — Rzadko, w lasach sosnowych i zaroślach. Lidzbark (welski) pow. Działdowo, Żuchowo pow. Lipno.

Circaea alpina L. — Dość rzadko, u nasady pni *Alnus glutinosa*. Jasiony pow. Żuromin, Lisiny pow. Rypin.

Polygalaceae

Polygala amarella Cr. — Dość rzadko, na torfowiskach i łąkach. Libowiec, Rumunki Likiec, Rumunki Wólczkańskie pow. Lipno.

Celastraceae

Evonymus verrucosa Scop. — Dość rzadko, w cienistych lasach liściastych. Nasięgniewo, Teodorowo, Wąkole pow. Lipno, Tomkowo, Trąbin pow. Rypin, Nowy Świat pow. Brodnica, Lubowidz pow. Działdowo, Kulin pow. Włocławek.

Araliaceae

Hedera helix L. — Dość rzadko, w lasach liściastych. Brzeźno, Nasięgniewo pow. Lipno, Kretki Małe, Okonin pow. Rypin.

Umbelliferae

Hydrocotyle vulgaris L. — Na torfowiskach, łąkach i wrzosowiskach. Antoniewo, Czarny Las, Gorzeszyn, Łochocin, Podole pow. Lipno.

Eryngium planum L. — Dość rzadko, przydroża, miedze, miejsca słoneczne. Dębiny, Kikół, Moszczonno, Nowogródek, Szpiegowo pow. Lipno.

Pimpinella maior (L.) Huds. — Rzadko, w lesie sosnowym z domieszką drzew liściastych. Szafarnia pow. Golub-Dobrzyń.

Seseli annuum L. — Rzadko, na wzgórzu w rezerwacie modrzewia polskiego — Płonne pow. Golub-Dobrzyń oraz na zboczach doliny Wisły — Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Gołyszewo pow. Lipno.

Peucedanum cervaria (L.) Lap. — Rzadko, w widnych, suchych lasach. Budki Suradowskie, Suradowo pow. Lipno.

Laserpitium prutenicum L. — Rzadko, w lasach sosnowych z domieszką dębu, brzozy i świerka. Lidzbark (welski), Borówno pow. Działdowo.

Primulaceae

Androsace septentrionalis L. — Rzadko, na suchych zboczach doliny Drwęcy, Lubicz pow. Toruń, oraz na zboczach doliny Wisły, Bachorzewo pow. Lipno.

Pirolaceae

Pirola media Sw. — Rzadko, w lasach sosnowych. Nagórzynek, Rumunki Jasieńskie, Wyrzuty pow. Lipno, Lubowidz pow. Działdowo.

P. rotundifolia L. — Rzadko, w lasach sosnowych. Zambrzyca pow. Sierpc, Lubowidz pow. Działdowo.

P. chlorantha Sw. — Rzadko, w lasach sosnowych obok miejscowości Wąkole pow. Lipno.

Chimaphila umbellata (L.) Nutt. — Dość rzadko, w suchych lasach sosnowych. Dębiny, Drozdowiec, Huta Skępska, Kwirynowo, Ławiczek, Maliszewo, Nowogródek, Wąkole pow. Lipno, Żelaźniki pow. Toruń, Jamielnik pow. Działdowo.

Monotropa hypopitys L. var. *glabra* Roth. — W lasach sosnowych z domieszką drzew liściastych. Kamienica, Małomin, Maliszewo, Radiochy pow. Lipno.

Ericaceae

Oxycoccus quadripetalus Gilib. — Na torfowiskach niskich i przejściowych. Gorzeszyn, Łochocin, Podole, Rumunki Czarne, Rumunki Skępe pow. Lipno, Rogowo, Rogówko, Rumunki Rogówko pow. Rypin, Szczutowo pow. Sierpc.

Ledum palustre L. — Na torfowiskach i w podmokłych lasach sosnowych. Bednarka, Ignackowo, Łąkie, Ławiczek, Łochocin, Mecowizna, Rumunki Komorowo pow. Lipno, Okalewo, Skudzawy pow. Rypin, Jamielnik pow. Działdowo.

Andromeda polifolia L. — Na torfowiskach, zwykle w miejscach częściowo zakrzewionych. Antoniewo, Popielarka, Rumunki Likiec, Rumunki Czarne, Gorzeszyn pow. Lipno.

Arctostaphylos uva-ursi L. — Dość rzadko, w suchych, widnych lasach sosnowych. Osówka, Radziochy, Sarnowo, Wąkole, Witowąż, Wylewy pow. Lipno.

Boraginaceae

Pulmonaria angustifolia L. — Rzadko, w lasach sosnowych z domieszką drzew liściastych. Lidzbark, Lubowidz pow. Działdowo, Kozie Błotko pow. Brodnica.

Solanaceae

Datura stramonium L. — Rzadko, obok zabudowań i w ogrodach. Dębiany, Kowalki, Zakrocz pow. Rypin, Lipno — obok stacji benzynowej.

Scrophulariaceae

Verbascum phoeniceum L. — Rzadko, na zboczach doliny Wisły. Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Gołyszewo pow. Lipno.

Linaria repens (L.) Mill. — Rzadko, na brzegu Wisły niedaleko miejscowości Tulibowo pow. Lipno.

Limosella aquatica L. — Dość rzadko, na brzegach Wisły i łąch. Złotoria, Grabowiec pow. Toruń, Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Gołyszewo, Glewo, Zarzyczewo Stare pow. Lipno, Kulin pow. Włocławek.

Lathraea squamaria L. — Rzadko, w lesie dębowo-grabowym obok miejscowości Zakrocz pow. Rypin.

Lentibulariaceae

Utricularia neglecta Lehm. — Rzadko, w dołach potorfowych i w zarastających stawach. Drozdowiec, Koziołek, Czarne, Radziochy pow. Lipno.

U. minor L. — W zarastających dołach potorfowych i na podmokłych torfowiskach. Babie Ławy, Brzeźno, Bogucin, Gorzeszyn, Jarczewo, Ignackowo, Kamienica, Podole, Rumunki Czarne, Rumunki Podgłódowo, Szczekarzewo, Witkowo pow. Lipno.

U. intermedia Hayne. — Rzadko, w zarastających dołach i na podmokłych torfowiskach z wodą na powierzchni. Babie Ławy, Krzyżówki pow. Lipno, Karlewo pow. Sierpc.

Labiatae

Prunella grandiflora Jacq. — Rzadko, na brzegach lasów sosnowych. Lidzbark (welski), Borówno, Nowy Dwór pow. Działdowo.

Stachys germanica L. — Rzadko, na suchym zboczach doliny Wisły. Bachorzewo pow. Lipno.

Elsholtzia Patrini (Lep.) Garcke — Rzadko, ogrody, przydroża. Zambrzyca pow. Sierpc, Sarnowo pow. Lipno, Dębiany pow. Rypin.

Plantaginaceae

Plantago pauciflora Gilib. — Dość rzadko, na polach w miejscach wilgotnych. Skudzawy, Dębiany, Zakrocz pow. Rypin, Zambrzyca pow. Sierpc.

P. indica L. — W miejscach piaszczystych, na wzgórzach, zboczach oraz przy torach kolejowych. Ostrowite, Rumunki Podgłódowo, Świerczyny, Wilcze Kąty pow. Lipno, Stajęczyny, Żelaźniki pow. Toruń.

Rubiaceae

Asperula tinctoria L. — Rzadko, na zboczach doliny Wisły i Mieni. Dębiny, Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Glewo pow. Lipno.

Campanulaceae

Campanula sibirica L. — Rzadko, na zboczach doliny Wisły w pobliżu miejscowości Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Glewo, Zarzyczewo Stare pow. Lipno, Krobia pow. Toruń.

C. cervicaria L. — Dość rzadko, na skraju lasu sosnowego obok miejscowości Karnkowo pow. Lipno.

Compositae

Bidens melanocarpus Wiegand. — Rzadko, na aluwiach nad Wisłą. Glewo, Tulibowo, Zarzyczewo Stare pow. Lipno, Kulin pow. Włocławek, Złotonia pow. Toruń.

Senecio paluster (L.) DC. — Dość rzadko, w zarastających dołach potorfowych. Ruda, Żale pow. Rypin. Moszczonno pow. Lipno.

Crepis paludosa (L.) Mnh. — Dość rzadko, w olszynach i zaroślach. Ruda, Żale pow. Rypin, Szpiegowo pow. Lipno.

Hieracium echinoides Lumtzer — Rzadko, na suchych zboczach doliny Wisły. Bachorzewo pow. Lipno.

H. sabaudum L. — Dość rzadko, w lasach sosnowych. Szczutowo pow. Sierpc, oraz w lasach liściastych — Paliwodzizna pow. Golub-Dobrzyń, Tomkowo pow. Rypin.

Potamogetonaceae

Potamogeton compressus L. — Dość rzadko, w dołach potorfowych. Kobrzyniec Stary, Rogowo, Rumunki Rogówko pow. Rypin, Rumunki Łąkie pow. Lipno.

Liliaceae

Lilium martagon L. — Rzadko, w lasach liściastych. Wąkole pow. Lipno, Ródzone pow. Golub-Dobrzyń, Tomkowo pow. Rypin.

Asparagus officinalis L. — Rzadko, na suchych zboczach doliny Wisły. Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Zarzyczewo Stare pow. Lipno.

Juncaceae

Juncus capitatus Weig. — Dość rzadko, na piaszczystych polach w miejscach wilgotnych. Czarnia Mała, Gorzeń, Ligowo, Osiek pow. Sierpc, Gorzeszyn, Maliszewo, Małomin, Mysłakowo, Podole, Rumunki Jasięńskie pow. Lipno.

J. macer Gray. — Rzadko, w lasach sosnowych przy liniach oddziałowych. Gorzeszyn, Podole, Rumunki Jasięńskie pow. Lipno.

Cyperaceae

Cyperus fuscus L. — Dość rzadko, w miejscach zamulonych, okresowo zalewanych. Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Gołyszewo, Glewo, Nowogródek, Włęcz, Zarzyczewo Stare pow. Lipno, Kulin pow. Włocławek, Złotorya pow. Toruń.

Eriophorum vaginatum L. — Dość rzadko, na śródleśnych torfowiskach przejściowych. Barany, Łochocin, Rumunki Komorowo, Oparczyska pow. Lipno.

Bulboschoenus maritimus (L.) Palla. — Rzadko, na brzegach łąk wiślanych. Bachorzewo, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Zarzyczewo Stare pow. Lipno, Kulin pow. Włocławek, Złotorya pow. Toruń.

Carex paradoxa Willd. — Na torfowiskach niskich. Grądy Nowe pow. Sierpc, Brzeszczki Duże, Rogowo, Rumunki Rogówko, Wierzchowiska pow. Rypin, Podole, Rumunki Jasięńskie pow. Lipno.

C. diandra Schrank. — Dość rzadko, na podmokłych torfowiskach. Krzyżówki, Rumunki Jasięńskie, Turza Wilcza pow. Lipno.

C. montana L. — Rzadko, widne lasy sosnowe z domieszką drzew liściastych. Borówno, Lubowidz, Nowy Dwór pow. Działdowo.

C. limosa L. — Dość rzadko, na podmokłych torfowiskach przejściowych. Barany, Rumunki Komorowo, Radomice pow. Lipno.

Gramineae

Hierochloë australis (Schr.) Roem. et Schult. — Rzadko w lasach sosnowych z domieszką drzew liściastych. Lidzbark (welski), Nowy Dwór, Piaseczno pow. Działdowo, Nowy Świat, Kozie Błotko pow. Brodnica.

Phleum Boehmeri Wib. — Na suchych zboczach doliny Wisły. Uniejowo pow. Płock, Bachorzewo, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Gołyszewo, Tulibowo, Zarzyczewo Stare pow. Lipno.

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. — Na torfowiskach niskich i przejściowych. Chelmica pow. Włocławek, Czarnia Mała, Grądy Nowe, Polik, Września, Szczutowo, Lipniki, Zambrzyca pow. Sierpc, Dębiny, Konotopie, Kwirynowo, Rumunki Jasięńskie pow. Lipno, Czumsk Duży, Rogówko, Rumunki Rogówko, Wierzchowiska pow. Rypin, Dobrzejewice pow. Toruń.

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. — Rzadko, w suchych lasach sosnowych. Ławiczek, Podole pow. Lipno.

Koeleria gracilis Pers. — Rzadko, suche zbocza doliny Wisły. Bachorzewo, Dobrzyń n. Wisłą, Gołyszewo, Glewo, Tulibowo, Zarzyczewo Stare pow. Lipno.

K. polonica Dom. — Dość rzadko, w lasach sosnowych. Gnojno, Nieszawka, Osówka, Stajęczyny, Witowąż, Wylewy pow. Lipno.

Orchidaceae

Liparis Loeselii (L.) Rich. — Rzadko, na podmokłym torfowisku obok zarastającego jeziora w pobliżu miejscowości Żałe pow. Rypin.

Sparganiaceae

Sparganium minimum Fr. — Dość rzadko, w płytkich dołach potorfowych i stawach. Czarne, Gorzeszyn, Ignackowo, Łochocin, Pokrzywnik, Podole, Rumunki Jasieńskie, Rumunki Sarnowo pow. Lipno, Lipniki, Polik, Szczutowo pow. Sierpc, Rumunki Rogówko, Młynik pow. Rypin.

Zakład Systematyki i Geografii Roślin U. M. K. w Toruniu

ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeit enthält ein Verzeichnis der Fundorte seltener Pflanzen, welche vom Verfasser im Jahre 1962 auf dem Diluvialplateau von Dobrzyń festgestellt worden sind. Unter den angeführten Pflanzenarten verdienen folgende besondere Beachtung: *Ricciocarpus natans*, *Thuidium lanatum*, *Scorpidium scorpioides*, *Dryopteris cristata*, *Equisetum maximum*, *E. ramosissimum*, *Salix livida*, *S. nigricans*, *Trollius europaeus*, *Isopyrum thalictroides*, *Cimicifuga europaea*, *Aconitum variegatum*, *Pulsatilla patens*, *P. pratensis*, *Nymphaea candida*, *Nuphar pumilum*, *Papaver strigosum*, *Viola collina*, *Sedum reflexum*, *Potentilla verna*, *Alchemilla glaucescens*, *Vicia lathyroides*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Seseli annuum*, *Peucedanum cervaria*, *Pirola media*, *Chimaphila umbellata*, *Pulmonaria angustifolia*, *Verbascum phoeniceum*, *Utricularia neglecta*, *U. intermedia*, *Stachys germanica*, *Elsholtzia Patrini*, *Campanula sibirica*, *Bidens melanocarpus*, *Hieracium echioides*, *H. sabaudum*, *Potamogeton compressus*, *Lilium martagon*, *Bulboschoenus maritimus*, *Hierochloë australis*, *Liparis Loeselii*.

Lehrstuhl für Systematik u. Geographie der Pflanzen der N. Copernicus Universität in Toruń