

ROMUALD OLACZEK

Nowe stanowisko janowca strzałkowatego (*Genista sagittalis* L.) w Polsce —
New locality of *Genista sagittalis* L. in Poland

Wpłynęło 30. IX. 1959

Janowiec strzałkowaty znany jest dotychczas w Polsce z występowania na dwu stanowiskach: w okolicach Tryńczy koło Przeworska, na krańcach Puszczy Sandomierskiej (Nowiński 1929, Furdyna 1952) oraz w okolicy Przasnysza na pograniczu województwa warszawskiego i olsztyńskiego (Wolak 1959). Trzecie z kolei stanowisko znalazłem w sierpniu 1958 roku w pobliżu wsi Piaski koło Nieborowa w powiecie łowickim (województwo łódzkie). Stanowisko to znajduje się w zachodniej części dużego kompleksu leśnego położonego nad rzeką dolną Rawką, w oddziale 89 uroczyska Nieborów (Nadleśnictwo Skierniewice). Dokładna lokalizacja tego stanowiska przedstawia się następująco: po prawej stronie drogi prowadzącej ze wsi Piaski na południowy wschód do wsi Grabskie Budy, około 150 m za skrzyżowaniem jej z tzw. Kozacką Drogą, łączącą wsi Wólka Łasiecka z Polesiem.

Droga, przy której rośnie *Genista sagittalis* L., wysadzona jest około 40-letnimi drzewami: *Tilia cordata*, *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Fraxinus pennsylvanica*. Po jednej stronie drogi znajduje się poręba, po drugiej rośnie zagajnik sosnowy 3—4 m wysoki. Tuż przy drodze, po stronie zagajnika, wśród gęstego trawiastego runa rośnie janowiec strzałkowaty na powierzchni około 2 m². W najbliższym jego sąsiedztwie występuje obficie *Poa pratensis* oraz nielicznie *Sedum acre*, *Hieracium pilosella* i *Carex hirta*. Rośliny te zajmują suche, piaszczyste siedlisko w warunkach dobrego nasłonecznienia; janowiec strzałkowaty dobrze się czuje na tym siedlisku, obficie kwitnie, owocuje i powiększa teren swego występowania.

Podobnie jak na dwu poprzednio w Polsce stwierdzonych stanowiskach, janowiec strzałkowaty z okolic Nieborowa należy do formy szerokolistnej: *f. latifolia* Rouy et Foucaud.

Janowiec strzałkowaty jest rośliną do Polski zawleczoną, w okolice Nieborowa przybył zapewne niedawno — jak o tym świadczy niewielki zasięg — prawdopodobnie w czasie lub po ostatniej wojnie. Gatunek ten występuje w rozproszonych stanowiskach poza granicą zasięgu w Czechosłowacji (Do-

stál 1950) i Niemczech (Hegi 1935, Hallier 1885), przy czym Hallier przypuszcza, że niektóre stanowiska w Niemczech podawane poza granicą zasięgu pozostają w związku z wysiewaniem janowca strzałkowatego na paszę dla zwierzyny. W Polsce można *Genista sagittalis* uznać za przybysza już zdomowionego i stopniowo rozpowszechniającego się, dlatego ważnym wydaje mi się notowanie czasu i miejsca pojawu jego nowych stanowisk.

Panu prof. drowi Jakubowi Mowszowiczowi serdecznie dziękuję za cenne wskazówki.

Katedra Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik: prof. dr Jakub Mowszowicz

LITERATURA

1. Dostál J. 1950. Květena ČSR. Praha, Přírodověd. Naklad.
2. Furdyna L. 1952. Występowanie janowca strzałkowatego (*Genista sagittalis* L.) w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 21.
3. Hallier E. 1885. Flora von Deutschland. 23 (1): 122—124. Gera.
4. Hegi G. 1935. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. 4 (3): 1195—1198. München. Lehmann-Verl.
5. Nowiński M. 1929. Stosunki geobotaniczne południowo-wschodniego krańca Puszczy Sandomierskiej. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU, 67, seria A/B.
6. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953. Rośliny polskie. Str. 347. Warszawa, PWN.
7. Wolak J. 1959. Stanowisko *Genista sagittalis* L. na północy Polski. Fragm. Flor. et Geobot. 5 (1): 97—98.

SUMMARY

The author has found a new locality of *Genista sagittalis* L. in a pine-forest near the village Nieborów (district Łowicz, Central Poland). This is the third locality of this adventive species in Poland.

Department of Plant Systematics and Geography, University of Łódź. Head: Prof. dr Jakub Mowszowicz