

ANDRZEJ MICHAŁSKI

**Grzybki pasożytnicze zebrane na łąkach nadnoteckich
na odcinku Władysławowo—Rynarzewo w roku 1954—
Les champignons parasites observés sur les basses
prairies de la rivière Noteć au district de Władysławo-
wowo—Rynarzewo en 1954**

(Wpłynęło 15. IV. 1955)

Notatka niniejsza jest przyczynkiem do poznania pasożytniczej flory grzybowej zaobserwowanej w r. 1954 w zbiorowiskach roślinnych w dolinie nadnoteckiej na jej odcinku w pobliżu osiedli Władysławowo—Rudy—Rynarzewo (województwo bydgoskie, powiat szubiński). Na ogólną ilość 38 gatunków na 43 żywicieliach najwięcej, bo 25 gatunków, przypada na rdze. Zebrane materiały zielnikowe włączono do zbiorów muzealnych Instytutu Ochrony Roślin Oddział w Bydgoszczy.

Phycomycetes
Peronosporaceae

Plasmopara pusilla (de Bary) Schroet, na liściach *Geranium pratense* L. Łąki. Rynarzewo. 23. V. 54. Dość pospolicie.

Ascomycetes
Erysiphaceae

Erysiphe Martii Lev. na *Trifolium pratense* L. Łąki umiarkowanie wilgotne. Rudy—Rynarzewo 3. X. 54. Pospolicie.

E. nitida (Wallr.) Rabenh. na *Ranunculus acer* L. Łąki. Rynarzewo. 3. X. 54. Pospolicie.

Sphaerotheca fuliginea (Schlecht.) Salm. na *Veronica longifolia* L. Łąki podmokłe i zarośla. Rowy. Władysławowo. 18. X. 54. Sporadycznie.

S. sanguisorbae (DC.) Blumer, na *Sanguisorba officinalis* L. Łąki wilgotne. Rudy—Rynarzewo. 3. X. 54. Pospolicie.

Hypocreaceae

Claviceps microcephala (Wallr.) na kłosach *Molinia coerulea* (L.) Moench. Brzegi wód. Na łąkach o glebach próchnicznych. Władysławowo. 10. X. 54 r. Niezbyt często.

Phacidiaeeae

Pseudorhynisma bistortae Juel. na *Polygonum bistorta* L. Łąka w pobliżu szosy do Rynarzewa. 5. VI. 54. Rzadko.

Basidiomycetes

Ustilaginales

Ustilago longissima (Sow.) Tul. na liściach *Glyceria aquatica* (L.) Wahlb. Pobrzeże wód. Rynarzewo 20. VII. 54. Pospolicie.

Uredinales

Caeoma aegopodii (Hebent) Wint. na *Aegopodium podagraria* L. Łąki. Rynarzewo. 23. V. 54. Sporadycznie.

Puccinia acetosae Schum. II. III. na *Rumex acetosa* L. Łąki. Władysławowo. Rynarzewo. 15. IX. 54. Często.

P. Airae (Langh.) Crusch et Mayor. II. III. na *Deschampsia caespitosa* (L.) P. B. Pospolicie na łąkach. Rynarzewo. 3. X. 54.

P. caricis Schroet. II. III. na turzycach (*Carex* sp.). Mokre łąki. Torfowiska. Władysławowo—Rynarzewo. 20. X. 54. Pospolicie.

P. cari-bistortae Kleb. II. III. na *Polygonum bistorta* L. Łąki. Władysławowo—Rynarzewo. 4. IX. 54. Pospolicie.

P. cnici oleracei Pers. III. na *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. Wilgotne łąki. Rudy—Rynarzewo. 3. X. 54. Dość pospolicie.

P. coronata Corda f. *phalaridis* Kleb. III. na liściach *Phalaris arundinacea* L. Brzegi wód. Władysławowo. 18. X. 54. Sporadycznie.

P. coronifera Kleb.

f. sp. *alopecuri* Erikss. na liściach *Alopecurus pratensis* L. Łąki. Rynarzewo. 3. X. 54. Często.

f. sp. *arrhenatheri* Kleb. II. III. na *Arrhenatherum elatius* (L.) P. B. Władysławowo—Rudy—Rynarzewo. Pospolicie na łąkach. 3. X. 54.

f. sp. *festucae* Erikss. III. na *Festuca pratensis* Huds. Łąki. Rynarzewo. 3. X. 54. Pospolicie.

f. sp. *holci* Kleb. II. III. na liściach *Holcus lanatus* L. Pospolicie na łąkach. Władysławowo—Rudy—Rynarzewo. 18. X. 54.

f. sp. *glyceriae* Erikss. III. na *Glyceria aquatica* (L.) W a h l. Brzegi wód. Mokre łąki. Władysławowo. 20. IX. 54. Rzadko.

P. graminis Pers. II. III. na źdźble *Agropyrum repens* (L.) P. B. Zarosła na łąkach. Rynarzewo. 3. X. 54. Dość rzadko.

P. galii Wint. III. na *Galium mollugo* L. Dość pospolicie na łąkach wilgotnych. Władysławowo—Rudy. 5. X. 54.

P. heraclei Grev. II. III. na *Heracleum sphondylium* L. Łąki. Rynarzewo. 3. X. 54. Dość pospolicie.

P. menthae Pers. II. III. na *Mentha arvensis* L. Łąki podmokłe. Władysławowo—Rudy. 10. IX. 54. Rzadko.

P. molinae Tul. III. na *Molinia coerulea* (L.) Moench. Łąki podmokłe i umiarkowanie wilgotne. Rynarzewo. 3. X. 54. Masowo. W okolicy Władysławowa i Rudy rdzy na trzęslicy nie zaobserwowano.

P. oreoselini (Strauss.) F u c k e l. II. III. na *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench. Łąki. Władysławowo. 18. X. 54. Sporadycznie.

P. phragmitis (Schum.) Kornicke. II. III. na *Phragmitis communis* Trin. Brzegi wód. Łąki podmokłe wzdłuż rzeki Noteci od Władysławowa do Rynarzewa. 3. X. 54. Masowo.

P. polygonii amphibii Pers. II. III. na *Polygonum amphibium* L. Pospolicie na łąkach mokrych. Rynarzewo. 3. X. 54.

P. pygmaea Erikss. II. III. na *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth. Łąki. Władysławowo. 18. X. 54. Sporadycznie.

P. suaveolens (Pers.-Rostr. II. III. na *Cirsium arvense* (L.) Scop Zarosła. 15. IX. 54. Tu i ówdzie.

P. taraxaci (Rebent.) P lowr. II. III. na *Taraxacum officinale* Web. Łąki w okolicy Rynarzewa. 3. X. 54. Pospolicie.

Uromyces dactylidis Otth. I. na liściach *Ranunculus repens* L. Wilgotne łąki. Rudy—Rynarzewo. 23. V. 54. Dość pospolicie.

U. fabae (Pers.) de B a r y. II. III. na liściach *Vicia angustifolia* L. oraz *Lathyrus paluster* L. Łąki wilgotne. Władysławowo. Rynarzewo. 8. X. 54. Pospolicie.

U. valerianae (Schum.) F u c k e l. II. III. na *Valeriana officinalis* L. Łąki podmokłe i torfowiska. Władysławowo—Rynarzewo. 15. X. 54. Dość pospolicie.

U. verruculosus Schroet. II. III. na *Melandrium album* (Mill.) Garcke. Tu i ówdzie na łące w okolicy Rynarzewa. 15. X. 54 r.

Coleosporium euphrasiae (Schum.) Wint. II. III. na *Alectorolophus minor* (L.) Wimm et Gr. Wilgotne łąki. Rynarzewo. 15. X. 54. Dość pospolicie.

Phragmidium fragariastrii (DC.) Schroet. III. na *Potentilla aiba* L. Zarosła. Władysławowo—Rudy. 8. X. 54. Rzadko.

Fungi Imperfecti
Sphaeropsidales

Phyllosticta aegopodii (Curr.) Allesch. na *Aegopodium podagraria* L. Łąki i zarośla. Władysławowo. 18. X. 54 r. Pospolicie.

Septoria alismatis Oudem. na *Alisma Plantago* L. Na łąkach w pobliżu Rynarzewa. 3. X. 54. Dość pospolicie.

S. centaureae (Roum.) Sacc. na liściach *Centaurea jacea* L. Łąki. Rudy. 18. X. 54. Dość pospolicie.

S. podagrariae Lasch. na *Aegopodium podagraria* L. na łąkach. Rudy. 18. X. 54. Pospolicie.

Hyphomycetes

Ramularia aromatica (Sacc.) na *Acorus calamus* L. Brzegi wód i mokre łąki. Władysławowo—Rynarzewo. 10. IX. 54. Sporadycznie.

Z Instytutu Ochrony Roślin, Oddział w Bydgoszczy.

LITERATURA

1. Blumer S., 1933. Die Erysiphaceen Mitteleuropas mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz, Zürich.
2. Boczkowska M., 1932. Choroby i szkodniki traw na torfach. Odb. z nr 2—3. Inżynieria rolna, Warszawa.
3. Diedicke H., 1915. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg und angrenzenden Gebiete. Band IX. Pilze VII — Sphaeropsidaceae, Melanconiaceae, Leipzig.
4. Gucewicz S. A., 1952. Obzor rzawczynnych gribow Kryma, Leningrad.
5. Jaczewskij A. A., 1913—1917. Opriedielitel gribow, t. I/II. S. Pietierburg.
6. Klebahn H., 1914. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Uredineae Ustilagineae. Band V a, Leipzig.
7. Savulescu T., 1953. Monografia uredinalelor din Republica Populara Romana. Acad. Rep. Pop. Rom., I—II.
8. Skirgiello A., 1954. Grzyby niższe. Prągrzyby i glonowce, Warszawa.

RÉSUMÉ

Pour la somme globale de 38 espèces de 43 plantes ménagères les plus nombreuses sont les rouilles — 25 espèces. Le reste appartient aux autres groupes systematiques.

Le materiel hercier est joint à la collection de musée de l'Institut de la Protection des Plantes à Bydgoszcz (Pologne).

Institut de la Protection des Plantes, Fil. à Bydgoszcz